



العلاج الطبيعي	امراض العظام	التغذية الراجيم السمنة	امراض الغدد الصم	امراض القلب و الدم	انف و اذن و حنجرة
التهضم	الامراض العصبية	الامراض الوراثية	الامراض المعدية	الامراض الجلدية	امراض العيون
السرطان	قسم الجراحة و التجميل	الحوادث و الاصابات	الحمل والولادة	الجهاز التنفسي	التطعيم و التحصين
الفم و الاسنان	الطب البديل و الاعشاب	الاسعافات الاولى	الصحة النفسية	الصحة العامة	الصحة الجنسية
	مرض الايدز	مرض السكري	المسالك البولية	الكبد و المرارة	

## النزلة المعوية

### النزلة المعوية

\* أسباب النزلات المعوية أو اضطرابات المعدة التالي:

- 1- الإصابة بالفيروسات.
- 2- تلوث الأطعمة أو الأغذية بالبكتيريا أو الطفيليات.
- 3- أعراض جانبية نتيجة لتناول بعض العقاقير أو الأدوية.
- 4- رد فعل عند تناول مادة غذائية جديدة. ونجد أن الأطفال هم أكثر إصابة نتيجة لهذا السبب بوجه خاص وبالنزلات المعوية بوجه عام فإذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية من ثدي أمه سيتأثر بآله تغيرات تنبّعها الأم في نظامها الغذائي.

\* أعراض النزلات المعوية:

- غثيان و قيء.
- إسهال.
- تقلصات البطن.
- انتفاخ.
- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة (في بعض الحالات).
- استمرار الأعراض لحوالي 36 ساعة.

\* الإسعافات الأولية للنزلة المعوية:

- شرب الكثير من السوائل وأولها الماء لمنع حدوث الجفاف.
- تناول بعض العقاقير ((Acetaminophen مثل: "تالينول" وغيرها من العقاقير الأخرى، مع أخذ الحذر بالابتعاد عنها إذا كانت هناك إصابات بالكبد.
- تناول أدوية للإسهال، وتجنبها إذا كان هناك دم يصلح عملية الإخراج أو مع ارتفاع درجة الحرارة (103 فهرنهايت) أو أعلى.

\* اللجوء إلى الطبيب:

- يتم اللجوء إلى الطبيب:

- إذا استمرت الأعراض لأكثر من 36 ساعة.

- إذا كانت عملية الإخراج يصاحبها نزول الدم.

- في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 103 فهرنهايت أو أكثر من ذلك.

- الشعور بالدوار أو الميل للغثيان عند النهوض.

- الارتباك والشعور بعدم الارتياح.

\* الإسعافات الأولية للنزلة المعوية عند الأطفال:

إذا كان هناك شك ما في أن طفلك مصاب بالنزلة المعوية:

- العمل على راحته واسترخائه.

- إذا توقف الطفل عن التقيؤ، عليك بإعطائه بشكل تدريجي كميات صغيرة من السوائل عديمة اللون مثل الماء.

- يمكنك إعداد وجبة غير دسمة له مثل قطعة من الدجاج مع الأرز وقطعة صغيرة من الخبز (بعد توقف القيء من 6 - 8 ساعات) .

- تجنب إعطائه الألبان أو منتجاتها أو الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون لبضعة أيام.

- تجنب إعطاء الأسبرين.

\* اللجوء إلى الطبيب:

يتم اللجوء إلى الطبيب إذا كان الطفل:

- غير متحكم في توازنه.

- يتقيأ دم.

- عملية الإخراج تصاحبها نزول دم.

- ظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم والجلد، الشعور بالعطش، ظهور الإعياء على العين، أو البكاء بدون دموع.

- ملاحظة عدم تبلل الحفاضات لمدة 8 - 12 ساعة، أو انخفاض الجزء اللين في الرأس للداخل.

**الجمرة الخبيثة**

عبارة عن مرض خمجي شديد ( عدوى ) عادة يصيب الحيوانات المجترة ، وينتقل إلى الإنسان عن طريق التلامس مع [اقرأ المزيد ...](#)

**التهاب المعدة السحجي المزمن**

هذا النوع من التهاب المعدة يكون على هيئة تقرحات معدية قلاعية أو نقطية عديدة (يكون التقرح على شكل بنور أو [اقرأ المزيد ...](#)

**تشخيص ألم الصدر**

إن ألم الصدر قد تسببه حالات كثيرة تتراوح شدتها من ضيق بسيط إلى تهديد لحياة المريض. وحالات القلب والرئة هي أكثر [اقرأ المزيد ...](#)

**التهاب العضلة القلبية**

مرادفات : إتهاب العضل القلبي ، التهاب العضلة القلبية ، القلاب ، إتهاب عضل القلب . Myocardite Myocarditis تعريف المرض : يصيب الالتهاب عضل [اقرأ المزيد ...](#)

**اعراض الايدز**

قد يكمن فيروس الأيدز في جسم الشخص لعشر سنوات أو أكثر بدون أن يحدث أي مرض. كما ان نصف الاشخاص [اقرأ المزيد ...](#)

**اعراض هبوط السكر ومضاعفات المرض**

ما هي أعراض هبوط السكر في الدم , و ماذا أفعل؟ من المهم جداً أن يعرف المُصاب بمرض السُّكري أعراض [اقرأ المزيد ...](#)

**روابط صديقة**

[Girls Games - ألعاب](#)

جميع محتويات صحة الموسوعة الصحية الحديثة هي بغرض المعرفة و المعلومات العامة و لا يجب ان تقوم بالاعتماد عليها او ان تستخدمها كبديل لزيارة الطبيب المتخصص فقد تكون المعلومات الواردة غير دقيقة او انها قديمة وقد يكون هناك اكتشاف او علاج أكثر تقدماً لحالتك بالتالي لا تقوم باستخدام أية معلومات واردة في الموقع بدون استشارة الطبيب المختص

تم انشاء الصفحة في 0.0019359588623 ثانية.

[Privacy Policy](#)